Evaluación de la respuesta terapéutica en pacientes con dolor crónico no oncológico

Edelmira Córcoles Ferrándiz[1,4], Eloi Merencio Naudin[2,4], Alicia González Rodríguez[1,4], Daniel Reyes Estévez[1,4], María Dolores Poyato Padillo[3,4], Pilar Ladrón de Guevara[1,4]

[1]Grupo de Dolor de SEFAC. [2]Coordinador del Grupo de Dolor de SEFAC. [3]SEFAC. [4]Farmacéutico/a comunitario/a.

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
SEFAC
Nº 290

INTRODUCCIÓN

Los tratamientos además de seguros han de ser eficaces. Los farmacéuticos comunitarios necesitan poder evaluar la respuesta terapéutica de estos tratamientos para poder colaborar y ayudar a obtener el objetivo final de los mismos.

OBJETIVOS

- Evaluar la respuesta terapéutica en pacientes con dolor crónico no oncológico con opioides fuertes Fentanilo y Tapentadol.
- Conocer la percepción que tiene el paciente sobre la eficacia y el objetivo de su tratamiento.
- Valorar si a dichos pacientes les gustaría que le ofreciéramos un Servicio Profesional Farmacéutico de abordaje de dolor crónico.

MATERIAL & MÉTODO

Estudio de corte observacional, descriptivo y transversal realizado entre enero/marzo de 2018 por 139 farmacéuticos comunitarios españoles, impulsado por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).

Población diana: mayores de 18 años que llegan a la farmacia comunitaria con prescripción de Fentanilo o Tapentadol para dolor no oncológico y aceptan participar.

Previamente a los farmacéuticos participantes se les facilitó, a través de la plataforma online **www.investigacionsefac.org**, procedimiento normalizado de trabajo, vídeo de aprendizaje para la toma de datos y formulario de recogida de datos.

Las variables recogidas fueron edad, sexo, patología, tiempo de evolución, indicación, motivo del dolor, principios activos dispensados (conocimiento de posología, administración y posibles reacciones adversas), evaluación de adherencia (Test de Haynes-Sackett), dolor (Escala EVA), expectativas relacionadas al tratamiento y la intervención del farmacéutico.

Finalmente se realizó el registro informático de los datos y se procedió al análisis de los mismos. El tratamiento estadístico de los datos se realizó con una hoja de aplicación informática MSExcel®.

RESULTADOS

En los pacientes del estudio la evaluación media del dolor fue de 6,18 puntos en la escala visual analógica EVA (dolor severo), un 52,83% de los pacientes con valores EVA superior a 6.

En cuanto a la percepción de la eficacia del tratamiento los pacientes consideran no tener el dolor controlado en un 52%. Su capacidad funcional ha mejorado para un 61,65% y su calidad de vida ha mejorado en un 66,50%.

Valores de la EVA





¿Le gustaría que le ofreciéramos un Servicio Profesional farmacéutico de abordaje del dolor crónico?



Para los pacientes, el objetivo del tratamiento es:

CONCLUSIONES

- **Los pacientes en tratamiento con opioides fuertes Fentanilo y Tapentadol no tienen bien controlado el dolor demandan un alivio del dolor y reconocen tener una mejor capacidad funcional y calidad de vida.**
- **La mitad de los pacientes estarían interesados en un servicio profesional farmacéutico de dolor crónico; El desarrollo de este servicio permitiría colaborar con el equipo multidisciplinar en la consecución del objetivo que se persiguen con estos tratamientos.**

Agradecimiento especial a los 139 farmacéuticos comunitarios que han colaborado en la realización de este estudio de forma desinteresada.

ALICANTE 2018
VIII CONGRESO NACIONAL DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
I REUNIÓN INTERNACIONAL DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
"NO SUEÑES TU PROFESIÓN VIVE TU SUEÑO"
www.congreso-sefac.org
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
24·25·26 DE MAYO | SEFAC