


Autores: Cayuelas Sanchis, MC; Navarro Selma, B; Ramón Manresa, C; Paredes Hernández, B; Gómez Durá, MP; López Villanueva, AC; Martínez Andreu, FJ.

Introducción

Autor correspondencia: mcarmancayuelas@redfarma.org

Actualmente, en la Comunidad Valenciana (CV), la tasa de intención de participar es del 38,52% cuando el indicador debería superar el 45% según los Criterios de Calidad de las Guías Europeas de Cribado. La tasa media de positivos en CV es del 6,71%. Por ello, se decide establecer una colaboración entre Salud Pública y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA) para, a través de las farmacias comunitarias, realizar acciones que puedan aumentar la participación de la población en esta Campaña.



Objetivo

Aumentar la participación en PPCCR a través de la labor de información y difusión mediante la Farmacia Comunitaria.

Método


Se realiza lo convenido entre el COFA y Salud Pública para que la FC participe en la difusión y sensibilización del PPCCR.

- Se realiza una formación previa (acreditada EVES), a los farmacéuticos colaboradores del departamento de Salud Pública de Torrevieja. Al comienzo de la campaña en cada municipio, se cita a las FC a sus Centros de Salud, para sincronizar la labor de todos los agentes sanitarios de la comunidad.
- Durante la campaña en el municipio la FC sensibiliza y difunde la PPCCR mediante cartelería, folletos e información oral.
- Al final de la campaña, la FC realiza la encuesta a aquellas personas entre 50-69 años, seleccionadas por el propio farmacéutico de forma aleatoria, durante 15 días, para valorar el grado de conocimiento de la población acerca del PPCCR y su participación en él y estudio de los datos.


Resultados

La práctica totalidad de las farmacias aceptaron ser colaboradoras. 13 farmacéuticos participaron en la encuesta. Se han entrevistado a 489 usuarios, con una edad media de 60-64 años. El 16% con antecedentes familiares de cáncer de colon. Del total participaron 53,8% mujeres. Los que ya habían participado tenían más antecedentes de cáncer de colon (17,5%) que los que no (13,6%).


Rango de edad y sexo de los participantes




MUJERES



HOMBRES




Intervención desde la FC




| PARTICIPADO YA (%) | KIT RECIBIDO | INTENCIÓN DE PARTICIPAR | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | SÍ | NO |
| SÍ 37,2% (19,8% con antecedentes) | / | / | / |
| NO 62,8% (13,7% con antecedentes) | SÍ 37,5% (14,8%) | SI | 71,32% (26,7%) |
| | | NO | 28,7% (10,7%) |
| | NO 62,5% (ant 13%) | SI | 81,8% (51,1%) |
| | | NO | 18,2% (11,4%) |

Rechazo a participar por grupos de edad



No tienen intención de participar



Conclusiones

Las farmacias, por su formación, rol profesional y accesibilidad son un recurso valioso para potenciar actividades de sensibilización y aumentar la participación en el PPCCR.

Agradecimientos

Agradecemos su colaboración a todos los farmacéuticos comunitarios que han participado en la Campaña.

BIBLIOGRAFÍA. Programa de Prevención de CÁNCER COLORRECTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. SERIE E. Nº 19. Generalitat V. Consellería de Sanitat. Segunda Edición. ISBN: 978-84-482-5628-9.